

# 的

学

呢

门螺  
的致病  
,几乎  
炎症。(

胃炎症定  
所有无制復

只接受了

方案 杰

外 治

黏膜

人为是

不良反

和优势。

发挥中医

分会组织

下。

由中国中

制定专家

引起的胃

治中的并

治疗方案

月形成

在  
见  
意  
同  
交

行

医学  
证  
依  
疗  
效  
信

过,  
过。  
强  
、

证据质量: 中  
(95% 相关检查  
ST 检测: 尿  
( LeB)、基  
活组织

行  
静  
它  
时

定 医

提 质 增 效 专 项

和 疾 炎 症 信

内瘤变的程度和范围予以分级描述。活动性炎症的存在、中度以上慢性炎症、淋巴细胞聚集或淋巴滤泡形成与 ST 感染密切相关。

证据质量: 高; 推荐强度: 强; 共识水平: 90%。

#### 1.1 诊断要点

ST 引起的胃炎诊断需要 ST 检测及内镜、胃黏膜活检病理组织学常规 S<sup>+</sup> 染色检查。ST 检测首选非侵入性检查, 如尿素呼气试验、粪便抗原试验 (备选); 对于采用前述方法首次 ST 检查阴性, 但内镜和胃黏膜活检病理组织学提示现症 ST 感染时, 应采用其他方法补充检测 ST; 黏膜活检病理组织 S<sup>+</sup> 染色或嗜银染色、OIF<sup>24</sup> 染色等可诊断 ST 感染, S<sup>+</sup> 染色诊断的准确性与病理医生的经验有关。同时需要根据内镜及病理组织学结果除外合并胃癌、消化性溃疡、胃黏膜相关组织淋巴瘤 (胃 G]UB 淋巴瘤) 及早期恶性病变及特殊类型胃炎等。

证据质量: 高; 推荐强度: 强; 共识水平: 90%。

#### 2 中医辨证

##### 2.1 病因

特定邪气 (ST) 感染。

##### 2.2 病位

病位在胃, 与脾、肝密切相关。

##### 2.3 病机

ST 经口直中胃腑, 导致胃失和降, 脾失健运, 肝失疏泄。现症感染多湿、热、气滞<sup>[25]</sup>, 胃黏膜存在炎症活动者以脾胃湿热、肝胃不和、寒热错杂为主要病机<sup>[26]</sup>。ST 根除后, 邪实得祛, 则脾胃功能渐复; 若病情深入, 如存在持续的中重度炎症或萎缩性胃炎, 则多为虚实夹杂<sup>[27]</sup>。

证据质量: 中; 推荐强度: 强; 共识水平: 80%。

ST 属于中医病因中外邪范畴, 且具有湿、热的性质。饮食起居不洁, ST 经口感染, 并通过口-口\*粪-口途径在人与人之间传播<sup>[27]</sup>。ST 特异性定居于胃黏膜上皮细胞表面及黏液层中, 引起胃黏膜慢性活动性炎症, 影响消化功能, 病位在胃, 并与脾、肝密切相关。脾胃损伤, 升降失常, 运化失司, 水液不布, 湿浊内生, 内外合邪, 湿热内蕴; 湿热困脾, 阻滞气机, 土壅木郁, 肝失疏泄; 脾为太阴, 胃为阳明, 热则伤阴, 湿则伤阳, 寒热错杂; ST 缠绵不去, 耗气伤正, 脾胃虚弱, 虚寒内生; 气机不畅, 久病入络, 血行受阻, 则胃络瘀血。ST 根除后, 若病情尚浅, 邪实祛除后脾胃功能得复; 若正气已伤, 或病变深入, 则脾胃受损, 气滞、湿阻、血瘀或并存, 表现为虚实夹杂。

##### 2.4 辨证分型

###### 2.4.1 脾胃湿热证

主症: 1) 胃脘灼热或疼痛; 2) 口黏或口臭。次症: 3) 嘈杂泛酸; 4) 渴不欲饮; 5) 纳呆泛恶; 6) 大便黏滞不爽; 7) 身重困倦。舌脉: 舌质红, 舌苔黄腻或厚;

脉滑数。

###### 2.4.2 寒热错杂证

主症: 1) 胃脘痞满, 遇冷加重; 2) 口干或口苦。次症: 3) 餐后胃脘胀痛; 4) 大便时干时稀; 5) 恶心呕吐; 6) 肠鸣。舌脉: 舌淡红, 苔黄或黄白相间, 脉细数。

###### 2.4.3 肝胃不和证

主症: 1) 胃脘胀满或攻撑作痛; 2) 胁肋胀闷不舒。次症: 3) 症状因情绪不遂复发或加重; 4) 喜长叹息; 5) 嗝气; 6) 反酸; 7) 口干口苦。舌脉: 舌淡红或红, 苔薄白; 脉弦。

###### 2.4.4 脾胃气虚证

主症: 1) 胃脘胀满或隐痛; 2) 餐后胀满不适加重。次症: 3) 倦怠乏力; 4) 食少纳呆; 5) 气短懒言; 6) 大便稀溏; 7) 排便无力; 8) 面色萎黄。舌脉: 舌淡, 或有齿痕, 苔薄白; 脉细弱或沉弱。

###### 2.4.5 脾胃虚寒证

主症: 1) 胃脘隐痛或隐隐不适; 2) 胃脘喜按或喜暖。次症: 3) 劳累或受凉后发作或加重; 4) 空腹症状加剧, 食后缓解; 5) 大便稀溏或完谷不化; 6) 四末不温; 7) 泛吐清水; 8) 神疲乏力。舌脉: 舌淡胖, 或有齿痕, 苔薄白或白滑; 脉沉迟无力。

###### 2.4.6 胃络瘀阻证

主症: 1) 胃脘痞满或痛有定处; 2) 胃脘痛如针刺。次症: 3) 夜间加重; 4) 胃脘拒按; 5) 进食后加剧; 6) 呕血; 7) 黑便。舌脉: 舌质暗红或有瘀点、瘀斑; 脉弦涩。

上述证型确定: 具备主症 (项, 或主症 \$ 项 j 次症 ≥ (项, 结合舌脉。

证据质量: 中; 推荐强度: 强; 共识水平: 80%。

参考现有的慢性胃炎、慢性萎缩性胃炎及 ST 感染的中医、中西医结合共识中辨证分型<sup>[28]</sup>, 并结合 ST 引起的胃炎中医证候变化规律<sup>[29]</sup>, ST 引起的胃炎存在活动性炎症者多以脾胃湿热、肝胃不和为主要证候, ST 根除治疗后, 若慢性炎症迁延或萎缩性胃炎患者, 则出现脾胃虚弱, 并伴气滞、湿蕴、血瘀。

#### 3 中西医协作治疗方案

##### 3.1 治疗目标

根除 ST, 缓解临床症状, 改善、逆转或消除胃黏膜炎症、萎缩、肠上皮化生等病变, 提高患者生活质量, 降低胃癌发生风险。

推荐强度: 强; 共识水平: 90%。

慢性胃炎的治疗的目的是去除病因、缓解症状和改善胃黏膜病变<sup>[1]</sup>。ST 引起的胃炎不论是否有临床症状均应接受根除治疗<sup>[1]</sup>。根除 ST 可改善胃黏膜炎症及萎缩, 降低胃癌发生风险<sup>[3]</sup>。应以根除 ST 为首要目的, 并对胃黏膜病变, 尤其是化生性萎缩、低级别上皮内瘤变开展中医药辨证施治, 降低胃癌发生风险。存在根除治疗制

衡因素患者,则以缓解症状和胃黏膜病变、减低胃癌风险为主要目的。

### 79( 治疗思路

中西医协作诊治应根据患者不同病情及人群特点开展分阶段、分层次协作诊疗。分阶段即根除 ST 阶段、根除后胃黏膜病变管理阶段;分层次即根据患者有无制衡因素、经治状况等分为一般人群、特殊人群,初次治疗人群、补救治疗人群等。对不同人群采用不同的干预策略和中西医协作治疗可充分发挥中医药改善症状、减少抗生素等药物的不良反应、改善胃黏膜病变的作用。中药的应用须辨证论治、审因论治、病证结合。

推荐强度: 强; 共识水平: \$%%d。

ST 可感染各类人群,造成了感染者的临床特征多样性以及临床获益的差异性,如是否合并基础疾病,是否存在药物禁忌,是否既往治疗失败等。应当根据患者病情及基本情况实施个体化处理。以抗生素为核心的西药根除 ST 疗效确切,但对缓解萎缩、肠上皮化生等胃黏膜病变疗效有限,补充维生素及微量元素等方案干预胃黏膜病变尚有争议。多中心随机对照临床研究显示,中西医结合方案在初次根除治疗<sup>[8K]</sup>和补救根除治疗<sup>[8J]</sup>中保持稳定的 ST 根除率同时,可有效缓解消化不良症状、减少不良反应。此外,ST 根除成功后,中医药对于慢性炎症尤其是萎缩性胃炎的管理,在个体化治疗、运用针对病理改变的中药、整体调理、毒副作用小可长期治疗等方面具有优势<sup>[8-]</sup>。

### 79' 中西医协作治疗方案

#### 79'9\$ ST 根除治疗

##### §) 一般人群的治疗

一般人群的定义: ST 感染胃炎成人患者(年龄\$) c K%岁),无根除治疗制衡因素(如合并肝肾功能异常等多系统疾病难以耐受药物治疗,存在过敏风险,正在应用与根除治疗用药存在相互作用的药物,存在肠道菌群失调等)。

证据质量: 中; 推荐强度: 强; 共识水平: \$%%d。

《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》将特殊人群定义为 K% 岁以上老年人及年龄小于 \$? 岁的儿童<sup>[K]</sup>,由于儿童 ST 感染检测及治疗策略与成人不同,故将一般人群的年龄阈值限定为 \$) 至 K% 岁。

ST 《幽门螺杆菌胃炎京都全球共识》<sup>[Q]</sup> 中根除治疗的制衡因素包括合并症、社区 ST 再感染率高、与卫生健康优先事项相冲突及经济花费,并考虑根除治疗带来负面影响,如抗生素治疗对胃肠道微生态的影响。

##### ① 一般人群的初次治疗方案

4) 经验性铋剂四联疗法,疗程为 \$? 天。抗生素组合参照《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》<sup>[K]</sup>: 阿莫西林 j 克拉霉素、四环素 j 甲硝唑、阿莫西林 j 甲硝唑、阿莫西林 j 四环素,并尽可能根据当地耐药情况,

首选耐药率低的抗生素组合。含有左氧氟沙星和呋喃唑酮的方案不推荐初次治疗使用。

证据质量: 高; 推荐强度: 强; 共识水平: >-9>d。

铋剂四联 \$% 天或 \$? 天方案是我国共识推荐的初次治疗主要方案,并应尽可能采用 \$? 天方案(除非证明当地 \$% 天方案根除率达 >%d 以上)。左氧氟沙星由于耐药率高且喹诺酮类药物应用广泛,借鉴国际及国内共识不推荐用于初次治疗。呋喃唑酮由于其安全性问题,国家药品监督管理局将其适应证修改为“仅用于难以根除的幽门螺杆菌感染”<sup>[(K)]</sup>,并要求停止含呋喃唑酮复方制剂的生产、销售和使用<sup>[(S)]</sup>。因此,不再将呋喃唑酮推荐应用于 ST 的初次治疗。

Z) 中西医结合四联疗法 [质子泵抑制剂 (VV#) j 有循证医学证据支撑的中成药或中草药辨证施治 j (种抗生素)],疗程为 \$? 天。中成药剂量遵药物说明书使用,中草药水煎剂或配方颗粒剂每日 (次)。

证据质量: 中; 推荐强度: 强; 共识水平: >-9>d。

中西医结合根除 ST 方案包括中药联合三联疗法、中药联合铋剂四联等,前者为当前临床证据最多的方案。随机对照临床研究发现,某些中药单味药免煎颗粒<sup>[(Q)]</sup>、中成药<sup>[(C)]</sup>及中药方剂<sup>[(?J(-)]</sup>联合三联疗法 \$? 天方案,在 ST 引起的胃炎中根除率与同研究中铋剂四联的根除率相当,临床症状缓解优于铋剂四联,更适用于消化道症状明显或铋剂不耐受的患者。中药联合铋剂四联 \$? 天方案作为初次治疗虽能有效缓解症状,但难以进一步提高根除率<sup>[(C-J(K)]</sup>,且同时用药过多。

##### ② 一般人群的补救治疗方案

补救治疗时间: 补救治疗应距离上一次根除治疗 ≥- 个月。

证据质量: 低; 推荐强度: 强; 共识水平: \$%%d。

ST 根除治疗中抗生素的应用可能提高 ST 菌体球形变率,球形变的 ST 对抗生素不敏感,其恢复正常形态需 ? 周左右的时间,因而短期内再次补救治疗成功率有限;临床研究发现,初次治疗和补救治疗的间隔越长,则根除率越高,- c \$( 个月的间隔后治疗根除率高于间隔时间小于 ' 个月者<sup>[(O)]</sup>,因此推荐补救治疗间隔 ≥- 个月为宜。

补救治疗方案: 铋剂四联疗法 \$? 天方案,并根据患者既往治疗抗生素应用史及当地抗生素耐药水平选择抗生素。为提高补救治疗的根除率,可依据病情,在铋剂四联根除治疗的不同环节联合中药。消化道症状显著者,可应用有循证医学证据支撑的中成药或中草药辨证施治 \$ c \$? 天,铋剂四联应用于第 \$= c () 天。无显著消化道症状者,铋剂四联治疗 \$ c \$? 天,有循证医学证据支撑的中成药或中草药辨证施治应用于第 \$= c () 天。既往治疗药物不良反应较明显者,采用有循证医学证据支撑的中成药或中草药辨证施治 j 三联疗法,疗程 \$? 天; 或可采用中成药或中草药辨证施治 j 铋剂四联疗程 \$% 天的方案。

证据质量：中；推荐强度：强；共识水平：>9)d。

需接受补救治疗患者其治疗失败因素可能持续存在。中药具有降低 ST 黏附力、改变 ST 的生存环境、抑制 ST 的耐药性等效应<sup>[6]</sup>。为提高根除率，参照《全国中西医整合治疗幽门螺杆菌相关“病-证”共识》中难治性 ST 中西医结合处理原则<sup>[2]</sup>及“标本兼治的分阶段综合疗法”<sup>[18]</sup>，

不全患者阿莫西林应慎用，并根据肾功能水平调整剂量；VV# 也应根据不同药品特点进行选择。

证据质量：高；推荐强度：强；共识水平：>9>d。

改良二联疗法目前被美国胃肠病学会推荐用于补救治疗<sup>[7]</sup>。GFI4 分析显示，VV# j 阿莫西林二联疗法同当前主流共识所推荐的根除治疗方案疗效和依从性相当，不良反应发生率更低<sup>[7]</sup>。我国几项随机对照临床研究结果显示，该方案作为初次治疗的根除率可达 >%d，不良反应发生率更低<sup>[7-7K]</sup>。一项研究显示，我国患者 ST 对阿莫西林的耐药率仍处于相对低水平<sup>[72]</sup>，该药为时间依赖抗生素，且在胃内 TS I - 时能够发挥最大程度的杀菌作用<sup>[7]</sup>，因而合理增加给药频率、选择受细胞色素氧化酶 V?=(E\$> (E' V(E\$>) 代谢型影响小的 VV# 可提高疗效。改良二联疗法给药频率虽增加，全天总量仍在安全剂量内，相较于铋剂四联减少了药物种类，更适宜于特殊人群的根除治疗。

Z) 三联疗法：细菌耐药性检测提示克拉霉素敏感者，可应用含阿莫西林、克拉霉素的三联疗法 \$? 天方案。

证据质量：中；推荐强度：条件；共识水平：>'9)d。

G4220.1: 30 H 共识推荐在克拉霉素耐药率低于 \$=d 的地区可继续应用三联疗法<sup>[7>]</sup>。由于我国克拉霉素耐药率普遍已超过这一水平，故推荐仅在细菌耐药性检测提示克拉霉素敏感者可予以含克拉霉素的三联疗法。

#### 29'9 ( ST 根除后的治疗

\$) 临床症状的处理：ST 引起的胃炎消化不良症状多在根除治疗成功后缓解。仍有症状者，可予以中药汤剂、中成药辨证治疗，或予以黏膜保护剂、动力调节剂、消化酶制剂等对症处理。

证据质量：高；推荐强度：强；共识水平：%%d。

-%d 以上的患者在根除 ST 后消化不良症状缓解<sup>[=J=\$]</sup>。症状持续不缓解或 - 个月内再度复发，可能合并功能性消化不良<sup>[=Q]</sup>。

() 胃黏膜病变的治疗：内镜下及组织学检测确诊的胃黏膜病变需根据其范围和程度决定干预策略。轻度非萎缩性胃炎一般无需进行专门的黏膜保护治疗，鸡皮样胃炎、胃体为主的中重度炎症者可予以中药辨证施治或胃黏膜保护剂，以促进病变的恢复。萎缩性胃炎在 ST 根除后应根据胃癌风险分级管理，“可操作的与胃癌风险联系的胃炎评估” (“UO])、“可操作的与胃癌风险联系的肠化生评估” (“UO#G) 分级分期系统有助于评估胃癌风险<sup>[Q]</sup>。推荐采用以中医药辨证施治为基础的中医或中西医结合治疗。

证据质量：中；推荐强度：强；共识水平：%%d。

ST 根除后胃黏膜炎症可得到缓解或胃黏膜恢复正常。萎缩性炎症、肠上皮化生、严重的胃体胃炎等病变胃癌发生风险增加，需要干预和随访<sup>[(> 7']</sup>。缓解、逆转

胃黏膜萎缩及肠上皮化生时中医药作用优势，辨证施治采用经方<sup>[=2]</sup>、自拟方<sup>[=-]</sup>、中成药<sup>[=-]</sup>对肠上皮化生均有一定的改善作用。

#### 29'9' 中医辨证治疗

\$) 脾胃湿热证。治法：清热化湿。主方：连朴饮加减。主要药物组成：黄连、厚朴、石菖蒲、法半夏、芦根、薏苡仁、栀子、蒲公英、茯苓、竹茹、甘草。

() 寒热错杂证。治法：平调寒热。主方：半夏泻心汤加减。主要药物组成：法半夏、黄连、黄芩、干姜、甘草、人参、大枣。

' ) 肝胃不和证。治法：疏肝理气和胃。主方：柴胡疏肝散加减。主要药物组成：北柴胡、陈皮、白芍、川芎、枳壳、甘草、香附。

? ) 脾胃气虚证。治法：健脾益气。主方：香砂六君子汤加减。主要药物组成：党参、白术、茯苓、甘草、木香、砂仁、陈皮、法半夏。

=) 脾胃虚寒证。治法：温中健脾。主方：黄芪建中汤加减。主要药物组成：黄芪、桂枝、白芍、生姜、大枣、茯苓、陈皮、法半夏、木香、砂仁、甘草。

-) 胃络瘀阻证。治法：活血通络。主方：失笑散合丹参饮加减。主要药物组成：五灵脂、蒲黄、丹参、檀香、砂仁、三七粉、延胡索、川楝子、甘草。

根除治疗期间，中药使用的疗程参照前述根除治疗方案。用药可在辨证的原则上，选择具有抗 ST 作用的中药，如大黄、黄连、黄芩、蒲公英、百药煎、吴茱萸、延胡索、大青叶等<sup>[=K J =\*]</sup>。ST 根除成功后，如需继续治疗，可在辨证施治基础上，根据患者胃镜及病理表现酌情用药，如针对肠上皮化生、上皮内瘤变，可选用白花蛇舌草、半枝莲、半边莲、藤梨根、白英等药<sup>[5']</sup>。如长期用药

食... 口腔... 使用... 避免长期... 规律饮食... 腌制... 油炸... 发酵奶... 富含维生素E... 引导患者... 避免... 焦虑

生... 和分餐... ST... 的风险... 口腔... 诸... 并可... 染复... 关[-K]... 吸烟... 感染... 胃癌前病... 危险... 也... 能与... 疗... 有关[-J]... 期间... 还可... 发生... 重 ST 感... 的氧化... 激反... [->]... 风险[KK]... 食品... 频率... 增加... 与... 发酵奶... 品的... 摄入... 可... 相... [-S]... 新鲜水... 蔬菜... 对... 胃癌... 预防... 有

方: S... 发率... 高地区... 患者, 根除... 治疗... 成功... \$年... 每次... 复查... 呼气... 试验; 胃... 癌... 风险... 需... 定... 查, 如... 不... 进行... 活... 组... 织... 检查, 建... 议... 同... 期... 复... 查... 粪... 便... 试... 验... 备... 选... 质... 量... ; 推... 荐... 强... 度... 条... 件... ; 共... 识... 水... 平:

除... 后... 可... 复... 发, 包... 括... “复... 燃”和... “再... 燃”。... 年... 平... 均... 复... 发... 率... 低... 于... “”, 与... 当... 地... 工... 业... 水... 平... [K2]。... 停... 一... 个... 月... 以... 上... 复... 发... 率... 相... 对... 增... 加... 建... 议... 一... 个... 月... 后... 复... 查... 占... 膜... 病... 变... : 非... 萎... 缩... 性... 炎... 症... 患... 者... 多... 数... 后... 经... 余... ST... 后... 性... 炎... 症... 能... 逐... 渐... 转... 为... 痊... 愈... 但... 其... 他... 因... 素... 持... 续... 存... 在... 如... 烟... 草... 吸... 入... 鸡... 皮... 蛋... 胃... 炎... 胃... 体... 重... 炎... 症... 患... 者... 进... 行... 内... 镜... 检... 查... 萎... 缩... 性... 炎... 注... 意... 病... 变... 范... 围... 及... 范... 围

“UO]”... O#G... Ⅱ期... 及... Ⅲ期... 监测... 随访... 病... 理... 诊... 断... 分... 级... 标... 准... 对... 不... 同... 程... 度... 的... 病... 变... 予... 以... 分... 级... 评... 价... 治... 疗... 前... 后... 病... 变... 范... 围... 和... 程... 度... 变... 化... 需... 关... 注... 活... 动... 性... 中... 度... 以... 上... 慢... 性... 炎... 症... 等... 与... ST... 密... 切... 相... 关... 的... 病... 理... 变... 化... 萎... 缩... 性... 胃... 炎... 还... 可... 采... 用... “UO]”分... 期...、“UO#G”分... 期... 对... 疗... 效... 进... 行... 评... 估... 为... 得... 到... 更... 为... 准... 确... 的... 活... 组... 织... 检... 查... 结... 果... 应... 重... 视... 活... 组... 织... 检... 查... 的... 部... 位...、深... 度...、数... 量...、取... 材... 的... 方... 法... 建... 议... 在... 胃... 窦...、胃... 角...、胃... 体... 部... 位... 取... 活... 组... 织... 检... 查... 可... 疑... 病... 灶... 处... 需... 另... 取... 活... 组... 织... 检... 查... 因... 病... 变... 呈... 灶... 性... 分... 布... 定... 标... 活... 组... 织... 检... 查... 技... 术... 对... 疗... 效... 评... 价... 有... 一... 定... 局... 限... 性... 证... 据... 质... 量... : 高... ; 推... 荐... 强... 度... : 强... ; 共... 识... 水... 平... : %%d。 K9= 生... 活... 质... 量... 评... 价 可... 采... 用... 《慢... 性... 胃... 炎... 中... 医... 诊... 疗... 专... 家... 共... 识... 意... 见... ( (%\$K) 》

证据质量: 中; 推荐强度: 强; 共... ST 感染存在家庭聚集现象, 影... 感染复发相关[-J,KK]。胃癌患者的... 疗 ST, 能够显著降低其胃癌发

### K 疗效评价

#### K9\$ 幽门螺杆菌根除判

首选尿素呼气试验... 其他可能影响呼气... 至少?周。呼气试... 粪便抗原试验可

#### 证据质量:

#### K9 ( 主要症

可参照... 的症状疗... 进行评... 行分... 效通... 访视

\$%

K

推荐的慢性胃肠疾病患者报告临床结局评价量表 ( T4, 01F50 .FT; 0FC ; 70; ; <F2 , VL" ) [5-] 及健康调查简表 \Y, ' - [ ]% 进行测评。

证据质量: 中; 推荐强度: 强; 共识水平: 95%。

中医、西医在 ST 感染引起的胃炎诊治中的各个环节各有优势。中医药以辨证论治为基础, 针对不同感染者在 ST 的根除治疗不同阶段发挥改善症状、减少不良反应、协同抗生素等作用, 并且对改善胃黏膜病变有独特的理论认识和临床诊治方法。现代医学对 ST 感染的精准诊断、危险分层、直接杀菌及高级别病变的内镜处理等方面具有优势。中西医协作, 优势互补, 则能够提高临床辨证的准确性和科学性、开展个体化论治、提高 ST 根除率、延缓或阻断病变进展, 实现对 ST 感染胃炎的全程管理。进一步开展中西医协作根除治疗方案、特殊人群治疗新方案及胃黏膜病变中西医协作的高质量临床研究, 提高证据水平, 规范临床诊疗, 将有助于 ST 感染胃炎的中西医协作防治。

项目负责人: 张学智

共识执笔人: 张学智, 魏玮, 蓝宇

/ 通讯作者: W345P9 07FW318 (-' 9 5F)

参与共识意见征集及表决的专家 (按姓氏笔画排序): 丁霞, 王化虹, 王垂杰, 白文元, 成虹, 刘力, 刘凤斌, 刘华一, 刘启泉, 刘绍能, 李军祥, 李岩, 李慧臻, 杨胜兰, 杨晋翔, 时昭红, 张北平, 张声生, 张学智, 陈苏宁, 周丽雅, 郑敬元, 房殿春, 赵文霞, 胡玲, 柯晓, 段丽萍, 姚树坤, 唐旭东, 唐志鹏, 唐艳萍, 黄穗平, 盛剑秋, 舒劲, 蓝宇, 魏玮

学术秘书: 叶晖

## 参考文献

[5] 国家消化系疾病临床医学研究中心(上海), 国家消化道早癌防治中心联盟(O^E], 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组, 等. 中国幽门螺杆菌根除与胃癌防控的专家共识意见(2016年, 上海) [J]. 中华消化杂志, 2016, 36(12): 753-760.

[6] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组, 等. 中国幽门螺杆菌根除与胃癌防控的专家共识意见(2016年, 上海) [J]. 中华消化杂志, 2016, 36(12): 753-760.

;; 52F5272 .FT; .D ; 5 SF61; ; Z4: 0F3.624445TD((50TD.45TD(9.218328009.218328j 0.4444450TD(; )Tj 0.4444430TD(Z)Tj 0.50TD(4)Tj 0.4444.7533.624F41T-(50TD

[?]陈晓伟 裴文婧，



Ef @ , B] UU^' I , E] G#UU^L# G , FD 46& ;C7CF546 C12; .CF.2& #5 !.;22<45 ! ] , E; .4 470 G , FD 46& FC2& L; <F ##: D3F A75:D1; 546 P4 C12; .CF.2[G]& ' .C FC& G:UF45 H]: ! F5;5 ] (%%-: ?\$> -?)-& " G , " B] S , " fe! ] G , FD 46& O71CF615F PF<F50 ;A SF61:; Z4:DF. TQ6; .1 15AF:D1; 5 15 @4T4 2FC ^C1D1; 5 [ @]& SF61:; Z4:DF. , (%\$> ,( ? ( ? ) : F \$%& \$\$\$ \$ \* 3F6& \$(=>K&

伟,史海霞,苏晓兰,等.辛开苦降法治疗慢性胃炎的疗效的 <FD4 分析 [ @]& 中国中西医结合杂志, ( ? ( \$ \$ ) : ) ' ( - ) ' )&

利,李佃贵,马小顺.化浊解毒方对幽门螺杆菌慢性胃炎患者胃黏膜病理的影响 [ @]& 中医杂志, = ( \$ - ) : \$ ' ) ' - \$ ' ) =&

0 b! , aS" e U' , aS] I O \ B , FD 46& L45C; , Z615C : 6151:46 D.146 ;A G; 67; C45 ( 摩罗丹 ) A; F5D ;A : 3.; 51: 4D.; T31: P42D.1D12 N1D3 CQ2T64214 [ #5DFP. GFC , (%\$- , (( ( \$ ) : > - \$ )&

成虹,高文,等.不同中药提取物对幽门螺杆菌体外抗菌活性研究 [ @]& 现代中医临床 , (%\$ = \$ - ( ' , )&

' ^ S , U# @ , FD 46& B3F 45D1Z4:DF.146 4:D1M1DQ ; A < 15F212 FD : 4<F6614F AF.<F5D4D4 ; 5 3F61:; Z4:DF. TQ 5 [ @]& ^MIC [42FC E; <T6F<F5D ] 6DF.54D GFC , (%\$ ( & C; 1: \$%& \$\$\$ = \* ( % \$ ) \* \$ ? > \$ K ' (&

柏,单兆伟,等.中草药单味与复方对幽门螺杆菌作用研究 [ @]& 中国中西医结合脾胃杂志 , ( % % ( - > ' &

红,程丽,等.蒲公英对幽门螺杆菌体外抑菌作用研究 [ @]& 胃肠病学 , (%\$ - , \$ \$ ( - ) : ' - = - ' - -&

或养胃舒治疗幽门螺杆菌相关性慢性胃炎和消化性溃疡”全国多中心临床研究科研协作组.温胃舒或养胃舒治疗幽门螺杆菌相关性慢性胃炎和消化性溃疡的全国多中心临床研究 [ @]& 中华医学杂志 , (%\$ % > % ( ( ) :

尹璐,瞿先侯,等.小建中胶囊联合三联疗法治疗幽门螺杆菌感染的临床疗效观察 [ @]& 中成药 , (%\$ - \$ ? ? -&

效及相关症

志 ( % \$ > , (

[ - ? ] 张建波,赵

菌相关性胃

( ) : \$ = - \$

[ - = ] 任一鸣,朱

沙星根除幽

( % \$ % = ( ) ) : \$

[ - - ] 牛亮亮,田金

炎

, FD 46& LF: 7. F5: F ; A SF61, 7T 2D7CQ [ @]& @ ! 1P ! 12 , ( % \$ K \$ ) ( \$ ) : ? K - = =&

[ K ] ES" # # @ , f#G EO , U^ ^ @' , FD 46& Y4<16Q 312D; .Q ; A P42, D.1: : 45: F. 45C 3F61:; Z4:DF. TQ6; .1 D.F4D<F5D [ @]& I ^5P6 @ GFC , (% ( % ; ) ) ( ( = ) : ? ( K - ? ' -&

[ K > ] B" ' " \ S # G ] " , I # \ S # a ] \_ ] B , f" # f ^ f & ^ 5C; 2; T1: FQ; D; : 64221A1: 4D1; 5 ; A SF61:; Z4:DF. TQ6; .1 15AF:D1; 5 45C P42, D.1: : 45: F. .12X C14P5; 212 [ @]& \_ ; .6C @ O42D.; F5DF.; 6 , ( % ( % , ( - ( = ) : ? - - - ? KK&

[ D ] 李鲁,王红妹,沈毅,等.健康调查量表中文版的研制及其性能测试 [ @]& 中华预防医学杂志 , (% ( ( ' - ( ( ) : ' ) - ? (&

( 收稿日期: ( % ( % J - J % ( ; 修回日期: ( % ( % J % ) J \$ (

[ 编辑: 焦 爽 ]